



Gebrauchsinformation



ISOPROPANOL 70 % (V/V)

Desinfektionsmittel

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Desinfektionsmittel

Anwendungsgebiete:

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktions peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktions von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlumschläge.

Gegenanzeigen:

Isopropanol 70 % (V/V) ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Warnhinweise:

Leicht entzündlich! Von Zündquellen fern halten!

Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten.

Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktions peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktions von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten lang feucht gehalten.

Für Kühlumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

Hinweise:

Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Isopropanol 70 % (V/V) wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



Nebenwirkungen:

Beim Einreiben der Haut mit Isopropanol 70 % (V/V) können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise:

Dicht verschlossen aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Zusammensetzung:

100 g Caelo Isopropanol 70 % (V/V) enthalten:

Wirksamer Bestandteil: 63,1 g 2-Propanol

Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser

Darreichungsform und Inhalt:

100 ml Lösung

Pharmazeutisches Unternehmen:

Caesar & Loretz GmbH

Herderstraße 31, D-40721 Hilden

www.caelo.de

Stand der Information: September 2025

V7846B 0925